



MANNENKLINIEK
Noord-Nederland

Informatie sterilisatie

Procedure, gevolgen en
mogelijke risico's



U wilt een sterilisatie. Wij informeren u graag over hoe een sterilisatie gaat, wat de gevolgen en mogelijke risico's zijn.

We zijn flexibel en u kunt snel bij ons terecht.

Een afspraak maakt u eenvoudig telefonisch op via onze website

Definitieve en betrouwbare anticonceptie

Sterilisatie is een definitieve, veilige en betrouwbare vorm van anticonceptie die in principe onherroepelijk is. Een hersteloperatie is namelijk een moeizame ingreep met een kleine kans dat u weer vruchtbaar zult zijn. U moet dan ook zeker weten dat u geen kinderen meer wenst.

Kleine ingreep

Een sterilisatie is een kleine ingreep die geen invloed heeft op uw seksueel functioneren. Het gevoel tijdens het klaarkomen wordt niet beïnvloed. En uw erectie, zin in seks en hormonen veranderen niet. De aanmaak van zaadcellen in de teelballen gaat gewoon door, maar door de onderbreking van de zaadleiters (sterilisatie) kunnen de zaadcellen niet meer doorstromen. Door het afsluiten van de zaadleiters kan er bij geslachtsgemeenschap geen bevruchting plaatsvinden, omdat de spermacellen het spermavocht niet meer bereiken. Het lichaam breekt deze zaadcellen zelf af. Uw zaadlozing ziet er net zo uit als voor de sterilisatie, maar de zaadcellen ontbreken. Na verloop van tijd stopt de productie van zaadcellen.

Soms in het ziekenhuis

De sterilisatie kan ook in het ziekenhuis worden gedaan. Een reden hiervoor kan zijn dat de zaadleider niet goed te voelen is omdat u eerder bent geopereerd aan uw balzak of in uw lies. Als dat zo is dan maken wij een afspraak voor u in het ziekenhuis. Aan het gesprek en het onderzoek in onze kliniek zijn dan geen kosten verbonden.



Over de ingreep

Een sterilisatie duurt 15 tot 20 minuten. Na het desinfecteren en één of twee verdovende injecties worden enkele kleine sneetjes gemaakt zodat de zaadleiters bereikbaar zijn. U heeft twee zaadleiters, zowel links als rechts. Beide zaadleiters worden doorgeknipt.

Daarna worden kleine stukjes van de zaadleiters verwijderd. De uiteinden worden afgesloten en als het nodig is worden de sneetjes gehecht met materiaal dat vanzelf oplost.

Op de wondjes komen gaasjes die er na een dag weer af mogen.

U kunt tijdens de ingreep een wat pijnlijk gevoel ervaren in uw liezen en onderbuik.

Wat u moet weten

Vóór de sterilisatie:

- Als u bloedverdunners gebruikt stopt u daar - in overleg met uw behandelaar - enkele dagen voor de behandeling mee.
- We adviseren u op de dag van de sterilisatie vrij te nemen en na de behandeling niet zelf naar huis te rijden.
- Om infectie te voorkomen moet u drie dagen voor de ingreep uw balzak helemaal scheren
- Omdat u plaatselijk wordt verdoofd mag u gewoon eten en drinken.
- We vragen u een strak zittende onderbroek of zwembroek mee te nemen. Tot twee dagen na de sterilisatie blijft u deze dragen.
- Vanaf 1 april 2023 bedragen de kosten €435,-. De rekening voor de sterilisatie dient u direct na de sterilisatie bij voorkeur per PIN-betaling te voldoen.

Na de sterilisatie:

Doe het rustig aan als u weer thuis bent, dat voorkomt bloedingen. Neem eventueel een paracetamol als de verdoving is uitgewerkt en uw onderbuik wat pijnlijk aanvoelt. Douchen kan weer op de dag na de ingreep en u kunt ook weer rustig aan het werk. Vermijd de eerste dagen zware klussen en de eerste week na de ingreep kunt u beter niet fietsen, sporten, zwemmen en fors tillen. Dat geldt ook voor het hebben van geslachtsgemeenschap omdat dit pijnlijk kan zijn en de kans op een bloeduitstorting vergroot. Voor masturbatie geldt dit niet. Maar als het niet prettig voelt kunt u dit beter even uitstellen.



Mogelijke risico's

Opnieuw vruchtbaar

1:3000

In uitzonderlijke gevallen (1:3000) komt het voor dat de uiteinden van de zaadleiters weer aan elkaar groeien en er opnieuw vruchtbaarheid ontstaat. Dan kan een tweede sterilisatie nodig zijn. Kosten hiervoor vallen buiten het tarief van de eerste sterilisatie.

Pijnklachten

3-4%

Een deel van de mannen (3-4%) houdt langer tot blijvend last van de balzak. Wanneer u na drie maanden nog steeds last heeft is het van belang contact op te nemen met Mannenkliniek Noord-Nederland of uw huisarts. Een verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut of pijnteam kan dan nodig zijn om chronische klachten te voorkomen.

Spijt

2-6%

Na een sterilisatie krijgt een klein deel van de mannen (2-6%) spijt van de behandeling, meestal omdat er een nieuwe kindrewens ontstaat.



Afspraak maken

In principe heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. Een sterilisatie valt in principe onder onverzekerde zorg, dat betekent dat u geen vergoeding ontvangt voor de ingreep van uw zorgverzekeraar.

Bent u jonger dan 30 jaar?

Dan is een verwijzing van uw huisarts nodig en komt u niet in aanmerking voor een sterilisatie direct. U krijgt dan eerst een informatief gesprek en bedenktijd.

Afspraak maken

Contactgegevens

Oedsmawei 24
9001 ZJ Grou

06 30 07 54 54

info@manklinieknoordnederland.nl

KVK: 83187596

AGB: 22227783

IBAN: NL75 ABNA 0105 0163 57

Mogelijke klachten

Bij ongeveer 4% van de mannen komt een nabloeding of een wondinfectie voor. Meestal verdwijnen de klachten (soms wat blauwe plekken, een vochtig wondje, een beurs gevoel of wat pijn bij het lopen) al na enkele dagen. Bij de volgende klachten moet u contact met ons opnemen:

- Ernstige, aanhoudende pijn.
- Aanhoudend bloedverlies uit de wond.
- Koorts boven 38,5 graden C.
- Plotseling dikker wordende balzak.

Spermaonderzoek

Na de sterilisatie duurt het nog enige tijd voordat u onvruchtbaar bent. Daarom is een voorbehoedsmiddel de eerste maanden na de ingreep nodig. Na drie maanden en/of na 25 tot 30 zaadlozingen moet u uw sperma laten onderzoeken om onvruchtbaarheid vast te kunnen stellen. U krijgt van ons een potje en de informatiefolder 'Spermaonderzoek'. Lees deze folder goed door. U ontvangt de uitslag van het spermaonderzoek telefonisch op de dag van het onderzoek. Zijn er geen spermacellen meer zichtbaar, dan bent u onvruchtbaar.

De kosten voor het spermaonderzoek bij de Mannenkliniek Noord-Nederland zijn inbegrepen in de prijs van de sterilisatie. Mocht u het onderzoek ergens anders laten doen, dan komen de kosten voor eigen rekening of gaat dit ten koste van het eigen risico van uw ziektekostenverzekering.